


U heeft in overleg met uw arts besloten radio-embolisatie te ondergaan. Deze behandeling bestaat uit twee opnames, de veiligheidsprocedure en de behandeling. Graag bereiden wij u met deze informatie voor op de behandeling. Heeft u na het lezen vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Opname 1 - veiligheidsprocedure




Bespreek voorafgaand aan de opname uw huidige medicatie.

U mag **2 uur** voor de ingreep niet meer eten. Het wordt aangeraden om goed te drinken.

De verpleegkundige ontvangt u op de verpleegafdeling.

Er volgt een uitleg en een gesprek met de arts. Uw naaste mag hierbij zijn en vertrekt na het gesprek.



U krijgt een infuus voor extra vocht, een maagbeschermer en medicatie tegen eventuele misselijkheid en voor het eventueel toedienen van pijnmedicatie tijdens het onderzoek.

De radioloog verdooft vervolgens uw lies. Er wordt een slangetje in de leverslagader ingebracht. De contrastvloeistof wordt ingespoten en er worden gelijktijdig foto's gemaakt. Daarna wordt er een kleine testdosis bolletjes ingespoten.

U gaat daarna naar de afdeling Nucleaire geneeskunde. Daar wordt een SPECT/CT scan gemaakt om te controleren of alle bolletjes op de goede plek terecht zullen komen.



Vervolgens gaat u naar de verpleegafdeling om een aantal uren bedrust te houden. Het been waarin u geprikt bent, moet u zo stil mogelijk houden.

's Avonds mag u naar huis.

Over het algemeen vindt de behandeling 1-2 weken na de veiligheidsprocedure plaats. De behandeling ziet er vrijwel hetzelfde uit als de veiligheidsprocedure.

Bijwerkingen

Neem onmiddellijk contact op met uw huisarts of dienstdoende arts in het ziekenhuis als:

- De wond in uw lies gaat bloeden. Dit kan namelijk duiden op een slagaderlijke bloeding. Raak niet in paniek, maar druk met uw vingers de slagader in uw lies dicht of laat dit doen door iemand anders.
- Er een toenemende zwelling in de lies optreedt. De lies is dan pijnlijk en dik.

Einde van de opname en leefregels

De plaats waar u geprikt bent, de punctieplaats, mag niet dik worden, gaan bloeden en/of heel erg pijnlijk worden. Om dit te voorkomen moet u de eerste tijd na de ingreep rustig aan doen. Het advies is:

- de dag na uw ontslag niet te veel te lopen, enkel kleine stukjes in en om het huis.
- het traplopen te beperken.
- de eerste drie dagen na ontslag niet zelf auto te rijden of fietsen.
- de eerste week na de ingreep niet te sporten of zware lichamelijke arbeid te verrichten.

Vanaf de eerste dag na uw ontslag kunt u weer douchen. Uw dagelijkse activiteiten van voor de behandeling kunt u meestal de derde dag na de ingreep hervatten.

Contactgegevens

Heeft u nog vragen over de radio-embolisatie behandeling neem dan gerust contact op met de afdeling Nucleair geneeskunde via telefoonnummer 088 75 588 18 of 088 75 577 81 (op werkdagen), 's avonds en in het weekend via 088 75 666 66.

U heeft in overleg met uw arts besloten radio-embolisatie te ondergaan. Deze behandeling bestaat uit twee opnames, de veiligheidsprocedure en de behandeling. Graag bereiden wij u met deze informatie voor op de behandeling. Heeft u na het lezen vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Opname 2 - behandeling




Bespreek voorafgaand aan de opname uw huidige medicatie.

U mag **2 uur** voor de ingreep niet meer eten. Het wordt aangeraden om goed te drinken.

De verpleegkundige ontvangt u op de verpleegafdeling.


Er volgt een uitleg en een gesprek met de arts. Uw naaste mag hierbij zijn en vertrekt na het gesprek.



U krijgt een infuus voor extra vocht, een maagbeschermer en medicatie tegen eventuele misselijkheid en voor het eventueel toedienen van pijnmedicatie tijdens het onderzoek.

De radioloog verdooft vervolgens uw lies. De lies wordt aangeprikt en de leverslagader wordt opgezocht en het slangetje gepositioneerd.

Bij de behandeling worden miljoenen radioactieve bolletjes toegediend. Deze bolletjes bestralen de tumor door hun radioactiviteit. Daarna wordt het slangetje verwijderd en de lies verbonden.



Vervolgens gaat u naar de verpleegafdeling om een aantal uren bedrust te houden. Het been waarin u geprikt bent, moet u zo stil mogelijk houden.

Tot enkele uren na de behandeling zou u klachten kunnen krijgen van pijn in de buik en misselijkheid. Zo nodig krijgt u daarvoor medicijnen.

's Ochtends word er een PET/CT scan gemaakt om te controleren of de bolletjes op de goede plek terecht zijn gekomen. Daarna mag u naar huis.

Bijwerkingen Einde van de opname en leefregels

Drie tot zes weken na de behandeling kunnen er klachten van misselijkheid, pijn in de leverstreek en vermoeidheid optreden. Dit gaat vanzelf over.

Neem onmiddellijk contact op met uw huisarts of dienstdoende arts in het ziekenhuis als:

- De wond in uw lies gaat bloeden. Dit kan namelijk duiden op een slagaderlijke bloeding. Raak niet in paniek, maar druk met uw vingers de slagader in uw lies dicht of laat dit doen door iemand anders.
- Er een toenemende zwelling in de lies optreedt. De lies is dan pijnlijk en dik.

De plaats waar u geprikt bent, de punctieplaats, mag niet dik worden, gaan bloeden en/of heel erg pijnlijk worden. Om dit te voorkomen moet u de eerste tijd na de ingreep rustig aan doen. Het advies is:

- de dag na uw ontslag niet te veel te lopen, enkel kleine stukjes in en om het huis.
- het traplopen te beperken.
- de eerste drie dagen na ontslag niet zelf auto te rijden of fietsen.
- de eerste week na de ingreep niet te sporten of zware lichamelijk arbeid te verrichten.

Vanaf de eerste dag na uw ontslag kunt u weer douchen. Uw dagelijkse activiteiten van voor de behandeling kunt u meestal de derde dag na de ingreep hervatten.

Contactgegevens

Heeft u nog vragen over de radio-embolisatie behandeling neem dan gerust contact op met de afdeling Nucleair geneeskunde via telefoonnummer 088 75 588 18 of 088 75 577 81 (op werkdagen), 's avonds en in het weekend via 088 75 666 66.