

Langwerkende antireumatische middelen: Abatacept (Orencia®)

Zorgeneid Reumatologie en Klinische Immunologie, locatie AZU.

In overleg met uw arts heeft u besloten het geneesmiddel abatacept te gaan gebruiken. Deze folder geeft informatie over dit geneesmiddel.

Werking

- Abatacept is een oplosbaar eiwit, dat verhindert dat bepaalde witte bloedcellen (T-cellen) een afweerreactie tegen lichaamseigen cellen in uw gewrichten in werking zetten of in stand houden.
- Langwerkende medicijnen zijn niet direct pijnstillend, maar kunnen de activiteit van de reumatische aandoening op langere termijn onderdrukken. Hierdoor nemen klachten als pijn, zwelling en stijfheid af en zijn minder kortwerkende medicijnen (vooral pijnstillers) nodig.
- Abatacept kan na twee maanden effect hebben.
- Abatacept kan gecombineerd worden met methotrexaat

Behandelmethode

Abatacept is de werkzame stof. De merknaam is Orencia®.

- Abatacept moet via een infuus worden toegediend. U wordt hiervoor opgenomen op de dagbehandeling van afdeling D2 west. De totale opname duurt ongeveer twee à drie uur.
- Het toedieningsschema van abatacept ziet er als volgt uit: week 0, week 2, week 4 en week 8. Daarna elke vier weken, tenzij anders aangegeven door uw behandelaar.
- Abatacept wordt meestal gegeven in combinatie met methotrexaat.
- Abatacept wordt gegeven aan patiënten die niet goed reageren op, of geen baat hebben bij één of meer DMARD's, inclusief één of meer TNF remmende middelen.

Bijwerkingen

Op korte termijn (tijdens het toedienen):

- Heel zelden kan er een allergische (overgevoeligheids)reactie optreden tijdens het toedienen van het medicijn via het infuus. Verschijnselen hiervan zijn:
 - Huiduitslag over het gehele lichaam
 - Kortademigheid
 - Spierzwakte
 - Lage bloeddruk
 - Hoofdpijn
 - Opvliegers

Om deze verschijnselen te verminderen kan uw arts besluiten tijdens het toedienen de snelheid van toediening te verminderen. De toediening neemt dan wat meer tijd in beslag. Ook kan uw arts de toediening even stopzetten totdat de verschijnselen verdwijnen en vervolgens de toediening hervatten. Abatacept kan misselijkheid, braken, buikpijn en diarree veroorzaken. Sommige mensen voelen zich na de infusietherapie moe en ziek.

Op langere termijn:

- Verhoogde kans op infecties, vooral van de bovenste luchtwegen en bijholtes. Verschijnselen van infecties zijn bijvoorbeeld: koorts, verkoudheid, griep, hoesten, keelpijn, ernstige kortademigheid en steenpuisten.
- Hoofdpijn
- Loopneus
- Huiduitslag, jeuk
- Maagpijn, diarree
- Gevoel van zwakte
- Duizeligheid
- Verhoogde bloeddruk

Abatacept is een relatief nieuw medicijn. Het is mogelijk dat nog niet alle bijwerkingen beschreven of goed bekend zijn. Dat geldt vooral voor de eventuele bijwerkingen op lange termijn. Indien dan ook één of meerdere van bovenstaande verschijnselen of andere lichamelijke veranderingen tijdens de behandeling optreden, neem dan contact op met huisarts, reumatoloog of verpleegkundig reumaconsulent. Er is (nog) niet aangetoond dat na een aantal infusen, allergische reacties zouden kunnen verergeren door antilichaamvorming tegen abatacept.

Adviezen

- Lees de bijsluiter.
- Bespreek uw vragen met uw behandelend arts of verpleegkundig reumaconsulent.
- Bij verschijnselen van infecties zoals koorts, verkoudheid, griep, hoesten, keelpijn, ernstige kortademigheid en steenpuisten, is overleg met uw (huis)arts of verpleegkundig reumaconsulent raadzaam.
- Als u geopereerd gaat worden (denk hierbij ook aan een grote ingreep bij de tandarts), is overleg met uw reumatoloog noodzakelijk. Doorgaans is het advies in de vijf weken voor een operatie geen abatacept te gebruiken.
- Als u zwanger wilt worden, is overleg met uw reumatoloog noodzakelijk. Doorgaans is het advies om gedurende de behandeling met abatacept tot 14 weken na de laatste toediening niet zwanger te worden.
- U mag geen borstvoeding geven tijdens en tot 14 weken na gebruik abatacept.
- Mannen die abatacept gebruiken, worden afgeraden zwangerschap te veroorzaken. Doorgaans is het advies om gedurende de behandeling met abatacept tot 14 weken na de laatste toediening geen zwangerschap te veroorzaken.
- Hebt u vragen over zwangerschap, overleg dan met uw behandelend arts of de verpleegkundig reumaconsulent.
- Als u abatacept gebruikt, is er geen bezwaar tegen de 'griep prik'.
- Vaccinaties (nodig voor sommige verre reizen) met verzwakt levend virus, zoals het gele koorts vaccin mogen niet plaatsvinden als u binnen vier weken met abatacept zult worden behandeld, als u met abatacept wordt behandeld, en als u korter dan drie maanden geleden met de behandeling van abatacept bent gestopt.

Vragen

Neem gerust contact op met het UMC Utrecht als u vragen heeft over het gebruik van uw medicijnen. U kunt uw vraag 24 uur per dag op het antwoordapparaat van onze helpline inspreken. Als u voor 16.00 uur belt, wordt u dezelfde werkdag nog teruggebeld. Indien u uw vraag na 16.00 uur inspreekt wordt u de volgende werkdag teruggebeld. Het telefoonnummer van de helpline is 088 - 7551494. Wij kunnen uw vragen ook via de e-mail beantwoorden. Het e-mailadres is poli-reumatologie@umcutrecht.nl