

Zorgeneheid Reumatologie en Klinische Immunologie, locatie AZU

*Langwerkende antireumatische
middelen: Azathioprine
(Imuran®)*

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten het geneesmiddel azathioprine te gaan gebruiken. Deze folder geeft informatie over dit geneesmiddel.

Werking

Langwerkende medicijnen zijn niet direct pijnstillend, maar kunnen de activiteit van de reumatische aandoening op langere termijn onderdrukken. Hierdoor nemen klachten als pijn, zwelling en stijfheid af en zijn minder kortwerkende medicijnen (vooral pijnstillers) nodig. Azathioprine remt het ontstekingsproces op de langere termijn. Het kan twee tot vier maanden duren voordat u merkt dat het medicijn begint te werken. Voor de behandeling van de reumatische aandoening wordt azathioprine meestal naast kortwerkende medicijnen (NSAID) gebruikt.

Andere toepassingen

- Azathioprine wordt ook gebruikt bij patiënten met Systemische Lupus erythematoses (SLE) als prednisonsparend middel.
- Azathioprine wordt ook toegepast bij orgaantransplantaties en kwaadaardige tumoren, meestal echter in veel hogere doseringen.

Behandelmethode

- Azathioprine is de werkzame stof en is bekend onder de naam Imuran®.
- Er bestaan tabletten met 25 mg en 50 mg werkzame stof. De eerste week wordt over het algemeen één tablet van 50 mg per dag voorgeschreven. Daarna worden meestal twee tabletten van 50 mg per dag voorgeschreven, of een dosering afhankelijk van uw gewicht.
- U kunt de tabletten doorslikken met voedsel, water of melk. Het is belangrijk dat u de tabletten niet breekt en kauwt, maar heel doorslikt.

Bijwerkingen

- Misselijkheid, braken, diaree;
- Verminderde eetlust;
- Ontsteking van het mondslijmvlies;
- Huiduitslag;
- Allergie;
- Koorts;
- Verhoogde vatbaarheid voor infecties;
- Afwijkingen in het bloed;
 - verstoorde aanmaak witte bloedcellen en daardoor grotere kans op infecties;
 - verstoorde aanmaak bloedplaatjes en daardoor grotere kans op blauwe plekken, bloedneus;
- verstoring van de functie van lever en alvleesklier.

Om de bijwerkingen in een vroeg stadium te ontdekken laat uw reumatoloog of de verpleegkundig reumaconsulent regelmatig uw bloed onderzoeken.

Adviezen

- Lees de bijsluiter.
- Bespreek uw vragen met uw (huis)arts of de verpleegkundig reumaconsulent.
- Gebruik nooit meer dan de voor u voorgeschreven hoeveelheid.
- Gebruik alcohol met mate. Dit in verband met ‘overprikkeling’ van de lever.
- Als u geopereerd moet worden, hoeft de azathioprine niet te worden gestopt.
- Als u zwanger wilt worden, is overleg met uw reumatoloog noodzakelijk. Azathioprine is niet schadelijk voor de ongeboren vrucht. Als het echter mogelijk is wordt de azathioprine vaak uit voorzorg toch tijdens de zwangerschap gestaakt.
- Als u azathioprine gebruikt, mag u geen borstvoeding geven.
- Mannen met een kindrewens kunnen azathioprine blijven gebruiken.
- Hebt u vragen over zwangerschap, overleg met uw (huis)arts of verpleegkundig reumaconsulent.
- Als u azathioprine gebruikt, is er geen bezwaar tegen de ‘griep prik’.

- Vaccinatie (nodig bij sommige verre reizen) met verzwakt levend virus, zoals het gele koorts vaccin gaat niet samen met het gebruik van azathioprine. Ook vaccinaties tegen bof, mazelen, rode hond (BMR) of tuberculose mogen niet samen met azathioprine worden gebruikt.
- Als u naast azathioprine urinezuurverlagende middelen gebruikt (bijvoorbeeld bij jicht, Zyloric® oftewel allopurinol) dient u uw arts te raadplegen. De dosis azathioprine moet dan worden aangepast.

Vragen

Neem gerust contact op met het UMC Utrecht als u vragen hebt over het gebruik van uw medicijnen. U kunt uw vraag 24 uur per dag op het antwoordapparaat van onze helpline inspreken. Als u voor 16.00 uur belt, wordt u dezelfde werkdag nog teruggebeld. Indien u uw vraag na 16.00 uur inspreekt wordt u de volgende werkdag teruggebeld.

Het telefoonnummer van de helpline is 088 75 514 94.

Wij kunnen uw vragen ook via de e-mail beantwoorden. Het e-mailadres is poli-reumatologie@umcutrecht.nl

Divisie Interne Geneeskunde en Dermatologie

Zorgeenheid Reumatologie en Klinische Immunologie, locatie AZU

UMC Utrecht, Locatie AZU, Heidelberglaan 100, Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

Tel 088 75 555 55

www.umcutrecht.nl

© 2012, UMC Utrecht, afdeling Interne en Externe Communicatie