

Langwerkende antireumatische middelen: sulfasalazine (Salazopyrine®)
Zorgeenheid Reumatologie en Klinische Immunologie, locatie AZU.

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten het geneesmiddel sulfasalazine te gaan gebruiken. Deze folder geeft informatie over dit geneesmiddel.

Werking

Langwerkende medicijnen zijn niet direct pijnstillend, maar kunnen de activiteit van de reumatische aandoening op langere termijn onderdrukken. Hierdoor nemen klachten als pijn, zwelling en stijfheid af en zijn minder kortwerkende medicijnen (vooral pijnstillers) nodig. Sulfasalazine remt het ontstekingsproces op de langere termijn. Het effect kan pas na zes tot acht weken optreden. Voor de behandeling van reumatische aandoeningen wordt sulfasalazine meestal naast kortwerkende medicijnen (NSAID) gebruikt.

Behandelmethode

- Sulfasalazine is de werkzame stof en is bekend onder de naam Salazopyrine®.
- Het medicijn bestaat uit tabletten met 500 mg werkzame stof.
- Neem de tabletten dagelijks in tijdens of na de maaltijd met een glas water. Omdat vooral in het begin van de behandeling met sulfasalazine buikklachten kunnen optreden, wordt een geleidelijk opbouwend schema gebruikt:
 - 1^e week: één keer per dag een tablet,
 - 2^e week: twee keer per dag een tablet,
 - 3^e week: drie keer per dag een tablet.
 - Daarna 2 keer per dag 2 tabletten.

Bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen van sulfasalazine zijn:

- In het begin van de behandeling kan er een stoornis in de bloedaanmaak (vooral de witte bloedlichaampjes) optreden.
- Buikpijn, misselijkheid en braken.
- Afname eetlust.
- Hoofdpijn en duizeligheid.
- Tijdelijke afname van de vruchtbaarheid bij de man (hersteld enkele maanden nadat het gebruik van het middel is gestaakt).
- Huidafwijkingen.
- Temperatuurverhoging.
- Verstoring van de leverfunctie.
- Urine en sperma kunnen een oranje kleur krijgen. Dit is onschuldig en gaat weer over op het moment dat u de tabletten niet meer gebruikt.

Om de bijwerkingen in een vroeg stadium te ontdekken, laat uw reumatoloog of de verpleegkundig reumaconsulent regelmatig uw bloed onderzoeken.

Adviezen

- Lees de bijsluiter.
- Bespreek uw vragen met uw arts of verpleegkundig reumaconsulent,
- **Bij erge keelpijn in combinatie met koorts, en/of bloedneuzen en het snel krijgen van blauwe plekken dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw (huis)arts.** Dit zijn namelijk allemaal tekenen van een verstoorde bloedaanmaak en de sulfasalazine dient dan zo spoedig mogelijk te worden gestopt.
- Gebruik nooit meer dan de voor u voorgeschreven hoeveelheid.
- Gebruik geen sulfasalazine als u overgevoelig bent voor sulfapreparaten.
- Gebruik geen sulfasalazine als u een lever - of nieraandoening heeft.
- Neem contact op met uw (huis)arts of verpleegkundig reumaconsulent als u hoge koorts heeft aan het begin van de behandeling met sulfasalazine.
- Als u geopereerd moet worden, hoeft de sulfasalazine niet te worden gestopt.

- Als u zwanger wilt worden, is overleg met uw reumatoloog noodzakelijk. Sulfasalazine is niet schadelijk voor de ongeboren vrucht. Als het echter mogelijk is, wordt de sulfasalazine vaak uit voorzorg toch tijdens de zwangerschap gestaakt.
- U mag geen sulfasalazine gebruiken als u borstvoeding geeft.
- Mannen kunnen tijdens het gebruik van sulfasalazine minder vruchtbaar zijn. Dit herstelt na het stoppen met het gebruik.
- Hebt u vragen over zwangerschap, overleg met uw (huis)arts of verpleegkundig reumaconsulent.
- Als u sulfasalazine gebruikt, is er geen bezwaar tegen de 'grieprik' en/of andere vaccinaties.
- Wees voorzichtig met alcoholgebruik. In combinatie met het gebruik van sulfasalazine is de kans groter dat u maagklachten krijgt. Bovendien is de kans op verstoring van de leverfunctie groter.
- Als u duif of duizelig bent, wees dan voorzichtig in het verkeer. U kunt dan beter niet zelf rijden.

Vragen

Neem gerust contact op met het UMC Utrecht als u vragen heeft over het gebruik van uw medicijnen. U kunt uw vraag 24 uur per dag op het antwoordapparaat van onze helpline inspreken. Als u voor 16.00 uur belt, wordt u dezelfde werkdag nog teruggebeld. Indien u uw vraag na 16.00 uur inspreekt wordt u de volgende werkdag teruggebeld. Het telefoonnummer van de helpline is 088 - 7551494. Wij kunnen uw vragen ook via de e-mail beantwoorden. Het e-mailadres is poli-reumatologie@umcutrecht.nl